COMMENT UTILISER VarroMed®

5 mg/ml + 44 mg/ml



1. Après-midi/soir

2. Dose adaptée à la force de chaque colonie



	5000-7000	7000-12000	12000-30000	>30000
	15 ml	15-30 ml	30-45 ml	45 ml



3. Agiter avant emploi.



4. Appliquer entre les cadres, sur les abeilles.

5. Après 6 jours, comptez les acariens morts.



6. Si nécessaire, répéter le traitement.



Graduation pratique pour un dosage facile

QUAND UTILISER VarroMed®

5 mg/ml + 44 mg/ml

SANS ORDONNANCE

VarroMed® est indiqué pour le traitement au printemps, en fin d'été/automne et en hiver - utilisable avec ou sans couvain- pour une régulation optimale du varroa. Le traitement du printemps est particulièrement important pour contenir la prolifération du varroa très tôt dans la saison.

En Europe, VarroMed® a été largement expérimenté et étudié dans des conditions climatiques diverses. L'efficacité de VarroMed a été vérifiée scientifiquement, sur le terrain, quelles que soient les conditions météo.

PRINTEMPS
1X OU 3X APPLICATIONS



FIN D'ÉTÉ/AUTOMNE:
3X – 5X APPLICATIONS



HIVER:
1X APPLICATION



PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE HIVER