LE BEE-NEW Octobre 2026

Le journal du GDSA-22

Numéro 7/ 2026

Pensez à déclarer vos ruchers ICI

Les Rubriques du mois

- Agenda
- Actualité du Rucher en Octobre
- Commande groupée de pièges Beevital (coréen)
- Évaluer l'état de votre colonie par la lecture d'un cadre

L'Agenda

- Assemblée Générale se déroulera le 6 Février 2027 à la Ville Davy (Quessoy) de 9 h00 à 17 h00, repas sur place (prix ?). Le programme sera diffusé ultérieurement.

- Distribution du matériel de la route d'or le 20 Février 2027 au gymnase de la Ville Davy le matin de 9h00 à 12h00.

Actualité du Rucher en octobre

Octobre : la saison est derrière nous



Nous voici arrivés à la fin de la saison apicole, le temps de se reposer d'une saison atypique,

(encore une diront certains). Grosse erreur ! Cette première quinzaine d'octobre est la période où l'on commence la saison suivante.

C'est le moment de la dernière visite avant l'hiver, ce qui signifie que nous rouvrirons nos ruches que fin février ; sauf pour les traitements de fin d'année (Varromed ou Apibioxal) lorsque l'on constate fin octobre une pression trop élevée du varroa.

Le rythme de la colonie change nettement. Il n'y a plus grand-chose à butiner dehors à part le lierre qui cette année, s'il offre les derniers pollens, n'apporte aucune réserve quant au nectar, cause sécheresse exceptionnelle, ce que confirment les balances en baisse depuis le début du mois.

Tout le contraire de l'an passé ou à cette même époque, il fallait décompresser les colonies pour laisser un peu de place à la reine pour pondre les dernières générations d'abeilles d'hiver. Rappelons-nous aussi, que grâce à quelques averses en juillet août 2025, les couverts avaient pu être faits, nous offrant une campagne bleue de phacélie au grand bonheur de nos avettes. Ce qui n'est pas le cas cette année ou tout n'est que poussière.

Le complément de provisions doit se faire maintenant afin de ne pas fatiguer les abeilles qui vont bientôt naitre et qui devront assurer le passage du relais au printemps.

La dernière visite d'automne est sans conteste la visite la plus importante d'une saison apicole ; elle déterminera le bon redémarrage de la colonie en fin d'hiver.....ou sa perte.

Varroa



Au rucher, il est temps de retirer les lanières d'Apivar, (10 semaines après fin juillet). Attention : cette opération casse le cordon de propolis qui assurait l'étanchéité du plafond pour celles et ceux qui travaillent « à l'ancienne » avec un plateau. Ce problème ne se pose pas lorsqu'un isolant/réflecteur en alu est posé directement sur les têtes de cadres, qui permet de refaire l'étanchéité entre autres. La pression varroa doit être évaluée afin d'envisager ou non un traitement de milieu d'hiver, hors couvain (si tant est que cela existe encore vu les hivers doux). Le moyen de mesurer cette pression sans déranger la colonie est le comptage des varroas sur lange.

Ma colonie est-elle assez forte ?



Au 1er octobre, il doit y avoir au moins 6 cadres bien garnis d'abeilles sur 7 cadres encadrés par les partitions qui auront été placées bien avant. Ne pas hésiter à remettre la colonie en

ruchette poly sur 6 cadres dès que c'est possible. Avantages : moins d'espace à chauffer, moins de provisions consommées (et donc moins de sirop à distribuer), plus de longévité des abeilles d'hiver et un redémarrage « sur les chapeaux de roues ».

Les provisions sont-elles suffisantes ?



Une ruche Dadant 10 cadres devrait peser plus de 30 kg avant hivernage dans nos régions, cependant beaucoup de facteurs interfèrent ce conditionnel : matériau de la ruche, son équipement, nombre de cadres, force de la colonie : 30000 abeilles, ça pèse plus lourd que 20000 !

On peut faire une approche différente en estimant la quantité de miel dans la ruche sachant qu'un cadre plein de provisions pèse environ 4 kg soit 2 fois 9 dm² ; il reste à totaliser le nombre de dm² remplis. On estime qu'entre 12 et 15 kg suffisent chez nous. Mais la colonie ne se nourrit pas que de miel, une estimation de la quantité de pain d'abeilles est un facteur déterminant pour la reprise l'an prochain. Un moyen simple de stocker des cadres de pollen en trop (rarissime) est le congélateur pour éviter les ravages de la fausse teigne qui ne s'arrête pas qu'à ceux-là.

Frelon à pattes jaunes



Frelon asiatique : classifié : danger sanitaire 2e catégorie DS2

sur les endroits non organisés dans le PPF, à part « bon courage », il ne me vient pas grand-chose à dire.

Sur les territoires dans lesquels le PPF, Piégeage de Printemps des Fondatrices de FA, est organisé, la pression frelon reste acceptable à condition de continuer à piéger fortement dans les ruchers, on peut ne pas se limiter et installer autant de pièges que de ruches. Personnellement, je continue à employer les bols V.C. entre autres. Je n'utilise surtout pas la grille verte de réduction d'entrée, qui bloque la colonie dans sa caisse pendant des semaines : mort assurée.

La harpe électrique a de bons résultats, mais ce matériel est onéreux et fragile. La nasse grillage a de très bons résultats (que certains ont appelé la nasse coréenne sur les zéros sociaux ???? et c'est parti !) ; pour 12€ de grillage, ce piège « nettoie » un rucher en quelques jours.

Que faire après la dernière visite ?



Surveillance extérieure, comptage varroa sur lange, matériel….. et participer aux réunions de votre GDSA 22.

***Article réalisé par M. Christian Guespin** (ancien Président du GDSA22)

Achat groupé de pièges Beevital Trap Velutina (coréen)



GDS Bretagne organise en lien avec le le GDSA22, un achat groupé de pièges sélectifs de marque Beevital, piège coréen *Velutina trap*.

Ce piège a prouvé son efficacité tout en étant sélectif. Ce groupement d'achat à l'échelle de la région Bretagne a permis d'obtenir un prix attractif de 35 € TTC/piège.

.....à voir ici les conditions proposées par le GDS-Bretagne
?

Organigramme de lecture d'un cadre




La lecture des cadres permet d'orienter le diagnostic de la colonie. Toutefois, de nombreuses situations peuvent se présenter.


Présentation réalisée par Thierry Le Goff.

D'après M Léandre Goydadin apiculteur et youtubeur de "une saison aux abeilles"

Lecture de l'épisode ICI

Bonne lecture !




COUVAIN UNIQUEMENT OUVERT
PRÉSENCE D'ŒUFS
debout et couché de 1 à 3 jours
ABSENCE D'ŒUFS
REINE VISIBLE
REINE MORTE depuis moins d'une semaine
(accident, maladie, vieillesse) ? ou colonie essaimée depuis longtemps et reine tuée lors du vol nuptial ?
Bien valider l'absence d'une reine vierge = RUCHE ORPHELINE
COLONIE EN REDÉMARRAGE
Pas encore de couvain fermé
PRÉSENCE DE LARVES
Pas de CR-O / CR-F
PRÉSENCE DE LARVES
Présence de CR-O / CR-F
SITUATION NORMALE
SITUATION CURIEUSE !
La reine vient tout juste de mourir ? Laisser faire quelques jours et re-vérifier
UNE REINE VA NAÎTRE (CR-O / CR-F)
CBO : une reine fécondée arrive. Ne surtout pas déranger !
LAISSER FAIRE
SI VALIDATION
Intervenir rapidement, elle va devenir RUCHE BOURDONNEUSE ?
COUVAIN UNIQUEMENT FERMÉ
ABSENCE D'ŒUFS
VÉRIFIER
absence de CR-O, CR-F de sauveté ou CBO / reine vierge
REINE VISIBLE
REINE MORTE depuis + d'une semaine
(accident, maladie, vieillesse) ? ou colonie essaimée depuis longtemps et reine tuée lors du vol nuptial ?
RUCHE ORPHELINE — Intervenir rapidement
BLOCAGE DE PONTE (+ d'une semaine)
Forte miellée = faire de la place
S'IL N'EST PAS TROP TARD
Pas de multiples œufs par cellule ou abondant couvain de mâles
SANS INTERVENTION RAPIDE
Devenue RUCHE BOURDONNEUSE : colonie nerveuse ? Vrombit ? Chante ?
COLONIE FORTE
Diviser et faire un essaim
SI COLONIE FAIBLE
Renforcer en couvain (avec ou sans abeilles)
INTRODUIRE
Reine vierge/fécondée, CR-F ou cadre avec œufs de - de 3 jours et abeilles
COLONIE TROP FAIBLE
À secouer définitivement
NETTOYER
et fermer la ruche pour réutilisation ultérieure
AUCUN COUVAIN OUVERT OU FERMÉ
Uniquement cellules de nectar et/ou pollen
PLUS D'ŒUF, PLUS DE COUVAIN
Reine morte depuis au moins 3 semaines…
REINE MORTE
(accident, maladie, vieillesse) ? ou colonie essaimée depuis longtemps et reine tuée lors du vol nuptial ?
RUCHE ORPHELINE
S'IL N'EST PAS TROP TARD…
ELLE VA DEVENIR
RUCHE BOURDONNEUSE : colonie nerveuse ? Vrombit ? Chante ?
SI COLONIE POPULEUSE
Introduire reine vierge/fécondée, CR-F ou cadre avec œufs de - de 3 jours et abeilles
EST DEVENUE BOURDONNEUSE
Plusieurs œufs par cellule, ponte uniquement dans des cellules de mâles
COLONIE À SECOUER
NETTOYER ET FERMER
pour réutilisation ultérieure

SI COLONIE FORTE	INTRODUIRE Reine vierge/fécondée, CR-

Couvain ouvert = couvain non operculé (œufs + larves)

Les Rédacteurs du journal du GDSA22 :

Georges Ponthieux, Thierry Le Goff, Sylvie Robin, Chrystine Vaillant.

Et toutes les bonnes volontés auxquelles nous faisons appel. Alors si vous avez un sujet à partager avec l'ensemble des adhérents, si vous vous sentez être "rédacteur d'un jour", si vous avez envie de vous impliquer ou tout simplement envie d'apporter votre aide, vous êtes les bienvenus pour de prochaines parutions.

Pour contacter le GDSA 22 :

- **Par mail :** contact@gdsa22.bzh
- **Par téléphone :** 06 80 68 89 30
- **Site Internet :** https://gdsa22.bzh
- **Par courrier : GDSA22 / Georges Ponthieux - 13 rue du Goëlo - 22590 Trégomeur**

La boîte postale, BP 70436, à 22404 Lamballe n'est plus active..